


CASCADA



Agronomische Daten

Ertrag relativ zu Zollernspelz	90 %
Pflanzenlänge	lang
Standfestigkeit	ø
Mehltau	++
Gelbrost	++
Braunrost	+
Blattseptoria	+
Ährenseptoria	keine Angabe
Ährenfusarium	keine Angabe
Hektolitergewicht Vesen	ø
Korngrösse	++
Bodenbedeckung	++

Bemerkungen

Klassischer Rotkornndinkel. Gute Blattgesundheit mit hoher Gelbrostresistenz. Sehr schöne Kornausbildung.

Qualitätseigenschaften

Fallzahl	+
Sedimentationswert	++
Rohprotein	+++
Feuchtkleber	+++
Kleberbeschaffenheit	dinkeltypisch weich
Wasseraufnahme	++
Teigstabilität	+
Extensogramm	+

Bemerkungen

Spitzenwerte bei Feuchtkleber und Protein.

Zulassung	2022
-----------	------

+++ herausragend ++ sehr gut + gut ø mittel - schwach ausgeprägt/anfällig

Nährstoffniveau



Reifezeitpunkt



Alle Sorten
im Überblick



Nachbau –
Entscheide Du



Sortenübersicht Winter- und Sommerdinkel

	Gletscher	Copper	Edelweisser	Asturin	Cascada	Serpentin	Raisa	Flauder
	Winterdinkel Zulassung: 2018	Winterdinkel Zulassung: 2018	Winterdinkel Zulassung: 2018	Winterdinkel Zulassung: 2022	Winterdinkel Zulassung: 2022	Winterdinkel Zulassung: 2018	Winterdinkel Zulassung: 2018	Wechseldinkel Zulassung: 2019
Agronomische Daten								
Nährstoffniveau des Standorts	mittel - intensiv	mittel - intensiv	mittel - intensiv	von eher extensiv bis mittel - intensiv	eher extensiv	mittel	mittel	mittel
Reifezeitpunkt	eher spät	mittel	früh-mittel	eher früh	mittel	mittel - spät	mittel - spät	früh (Winter) spät (Sommer)
Ertrag relativ zu Zollernspelz	102 %	90 %	97 %	103 %	90 %	100 %	98 %	86 %
Pflanzenlänge	kurz - mittel	mittel	mittel	mittel	lang	lang	mittel - lang	mittel - lang
Standfestigkeit	+	+	+	+	Ø	Ø	Ø	+
Mehltau	++	++	+	Ø	++	++	+	+
Gelbrost	+	++	Ø	+	++	+	++	Ø
Braunrost	Ø	-	Ø	-	+	+	++	+
Blattseptoria	++	+	+	Ø	+	Ø	++	Ø
Ährenseptoria	+	+	+	k.A.	k.A.	-	+	+
Ährenfusarium	++	Ø	+	k.A.	k.A.	+	++	++
Hektolitergewicht	+	+	+	+	Ø	Ø	Ø	Ø
Korngrösse	+	++	+	++	++	+++	-	-
Bodenbedeckung	++	++	+	Ø	++	++	Ø	Ø
Qualitätseigenschaften								
Fallzahl	+++	Ø	++	+	+	+++	+	Ø
Sedimentationswert	Ø	+++	+	+	++	Ø	++	Ø
Rohprotein	+	+	++	++	+++	Ø	++	Ø
Feuchtkleber	+	+	++	++	+++	Ø	++	Ø
Kleberbeschaffenheit	dinkeltypisch sehr weich	dinkeltypisch etwas fester	dinkeltypisch weich	dinkeltypisch weich	dinkeltypisch weich	dinkeltypisch weich	dinkeltypisch weich	dinkeltypisch weich
Wasseraufnahme	+	++	++	++	++	+	Ø	+
Teigstabilität	-	++	+	++	+	Ø	Ø	Ø
Extensogramm	Ø	+	+	Ø	+	Ø	+	Ø
Kurzbeschreibung	Weisskorntyp. Ertragstreu und -stark. Sehr auswuchsfest. Hohe Gelbrostresistenz, gute Standfestigkeit.	Rotkorntyp. Herausragende Backqualität. Gute Standfestigkeit. Hohe Gelbrostresistenz.	Weisskorntyp. Zügige Jugendentwicklung. Sehr frühreif, standfest und ertragsstark. Gute Verarbeitungsqualität. Gelbrostkritische Standorte meiden.	Rotkorntyp, frühreif. Vermag sehr hohe Erträge mit einer guten Qualität zu kombinieren. Breites Anbauspektrum. Braunsrostkritische Standorte meiden.	Rotkorntyp, herausragende Qualität, schöne Kornausbildung auch in schlechten Jahren, hohe Geldbrostresistenz.	Rotkorntyp, sehr wüchsig mit extrem guter Bodenbedeckung bis zur Abreife. Gute Strohernte. Herausragende Auswuchsfestigkeit.	Rotkorntyp, beste Blatt- und Ährengesundheit. Gelbrostresistent. Steile Blatthalterung im Frühjahr, daher gut striegelfähig, später gute Bodenbedeckung.	Weisskorntyp, Wechseldinkel mit sehr guter Frosttoleranz. Sehr frühreif im Winteranbau.