

RAISA



Agronomische Daten

Ertrag relativ zu Zollernspelz	98 %
Pflanzenlänge	mittel - lang
Standfestigkeit	Ø
Mehltau	+
Gelbrost	++
Braunrost	++
Blattseptoria	++
Ährenseptoria	+
Ährenfusarium	++
Hektolitergewicht Vesen	Ø
Korngrösse	-
Bodenbedeckung	Ø

Bemerkungen

Rotkornotyp. Beste Blatt- und Ährengesundheits. Eher kleinkörnig. Gut striegelfähig, da steile Blatthaltung im Frühjahr. Bis Ende Ährenschieben zunehmende Bodenbedeckung.

Qualitätseigenschaften

Fallzahl	+
Sedimentationswert	++
Rohprotein	++
Feuchtkleber	++
Kleberbeschaffenheit	dinkeltypisch weich
Wasseraufnahme	Ø
Teigstabilität	Ø
Extensogramm	+

Bemerkungen

Weicher, dinkeltypischer Teig. Mittlere Mehlausbeute.

Zulassung	2018
-----------	------

+++ herausragend ++ sehr gut + gut Ø mittel - schwach ausgeprägt/anfällig

Nährstoffniveau



Reifezeitpunkt



Alle Sorten im Überblick



Nachbau - Entscheide Du



Sortenübersicht Winter- und Sommerdinkel

	Gletscher	Copper	Edelweisser	Asturin	Cascada	Serpentin	Raisa	Flauder
	Winterdinkel Zulassung: 2018	Winterdinkel Zulassung: 2018	Winterdinkel Zulassung: 2018	Winterdinkel Zulassung: 2022	Winterdinkel Zulassung: 2022	Winterdinkel Zulassung: 2018	Winterdinkel Zulassung: 2018	Wechseldinkel Zulassung: 2019
Agronomische Daten								
Nährstoffniveau des Standorts	mittel - intensiv	mittel - intensiv	mittel - intensiv	von eher extensiv bis mittel - intensiv	eher extensiv	mittel	mittel	mittel
Reifezeitpunkt	eher spät	mittel	früh-mittel	eher früh	mittel	mittel - spät	mittel - spät	früh (Winter) spät (Sommer)
Ertrag relativ zu Zollernspelz	102 %	90 %	97 %	103 %	90 %	100 %	98 %	86 %
Pflanzenlänge	kurz - mittel	mittel	mittel	mittel	lang	lang	mittel - lang	mittel - lang
Standfestigkeit	+	+	+	+	Ø	Ø	Ø	+
Mehltau	++	++	+	Ø	++	++	+	+
Gelbrost	+	++	Ø	+	++	+	++	Ø
Braunrost	Ø	-	Ø	-	+	+	++	+
Blattseptoria	++	+	+	Ø	+	Ø	++	Ø
Ährenseptoria	+	+	+	k.A.	k.A.	-	+	+
Ährenfusarium	++	Ø	+	k.A.	k.A.	+	++	++
Hektolitergewicht	+	+	+	+	Ø	Ø	Ø	Ø
Korngrösse	+	++	+	++	++	+++	-	-
Bodenbedeckung	++	++	+	Ø	++	++	Ø	Ø
Qualitätseigenschaften								
Fallzahl	+++	Ø	++	+	+	+++	+	Ø
Sedimentationswert	Ø	+++	+	+	++	Ø	++	Ø
Rohprotein	+	+	++	++	+++	Ø	++	Ø
Feuchtkleber	+	+	++	++	+++	Ø	++	Ø
Kleberbeschaffenheit	dinkeltypisch sehr weich	dinkeltypisch etwas fester	dinkeltypisch weich	dinkeltypisch weich	dinkeltypisch weich	dinkeltypisch weich	dinkeltypisch weich	dinkeltypisch weich
Wasseraufnahme	+	++	++	++	++	+	Ø	+
Teigstabilität	-	++	+	++	+	Ø	Ø	Ø
Extensogramm	Ø	+	+	Ø	+	Ø	+	Ø
Kurzbeschreibung	Weisskorntyp. Ertragstreu und -stark. Sehr auswuchsfest. Hohe Gelbrostresistenz, gute Standfestigkeit.	Rotkorntyp. Herausragende Backqualität. Gute Standfestigkeit. Hohe Gelbrostresistenz.	Weisskorntyp. Zügige Jugendentwicklung. Sehr frühreif, standfest und ertragsstark. Gute Verarbeitungsqualität. Gelbrostkritische Standorte meiden.	Rotkorntyp, frühreif. Vermag sehr hohe Erträge mit einer guten Qualität zu kombinieren. Breites Anbauspektrum. Braunsrostkritische Standorte meiden.	Rotkorntyp, herausragende Qualität, schöne Kornausbildung auch in schlechten Jahren, hohe Geldbrostresistenz.	Rotkorntyp, sehr wüchsig mit extrem guter Bodenbedeckung bis zur Abreife. Gute Strohernte. Herausragende Auswuchsfestigkeit.	Rotkorntyp, beste Blatt- und Ährengesundheit. Gelbrostresistent. Steile Blatthalterung im Frühjahr, daher gut striegelfähig, später gute Bodenbedeckung.	Weisskorntyp, Wechseldinkel mit sehr guter Frosttoleranz. Sehr frühreif im Winteranbau.